

was geworden als de vader. De mannetjes vechten echter verschrikkelijk in de paartijd en op een morgen lag een der mannetjes, waarschijnlijk het oude dier, hevig verwond en bijna dood in het hok. De buik was opengereten en de ingewanden kwamen er uit. Ook aan de kop had het diertje enkele diepe wonden. De overwinnaar was gezond. Dit drama zal zich echter wel eens meer afspelen want het is heel moeilijk de mannetjes van de wijfjes te onderscheiden, als ze nog niet volwassen zijn en het is nog moeilijker om de dieren te vangen.

Uit het bovenstaande moge echter blijken, dat het houden van kantjils niet zo'n heksentoer is. Maar men moet beginnen met gezonde dieren en verder zorgen, dat ze rijkelijk en het juiste voedsel krijgen. Het zijn aardige dieren en het blijft steeds opnieuw de moeite waard om naar de dieren te kijken, wanneer ze op het voedsel afkomen.

D. v. L.

EEN MERKWAARDIGE RAMBOETAN-VRUCHT.


Voor een merkwaardige ramboetan-vrucht vraag ik een oogenblik de aandacht van de lezers der Tropische Natuur.

Van buiten zag de bedoelde, zoo van den boom geplukte vrucht er precies eender uit als iedere andere ramboetan. Bij het doorsnijden bleek ze wormstekig te zijn — althans

zoo dacht ik op het eerste gezicht. Dan maar aan LEEFMANS cadeau doen, was m'n idee; die kweekt uit zoo'n voor de consumptie minder geschikt voorwerp altijd nog wel weer de een of andere interessante kever of vlinder op. Zonderling, de larven bewogen zich heelemaal niet; zouden ze misschien dood zijn? Ik keek eens wat beter toe en ja, wat was het geval... de vermeende larven bleken de worteltjes te zijn van het reeds binnen de vrucht tot kieming gekomen ramboetan-zaad. Een geval van viviparie dus.

Tusschen vruchtschil en arillus (het z. g. n. vruchtvleesch) had het wortelstelsel zich net- en parasolvormig uitgebreid, flauwe groeven achterlatend niet alleen in de gladde binnenoppervlakte van de vruchtschil maar ook in de gelatineuse arillus-massa.

Wat mij echter wel het meest frappeerde, was de donkergroene kleur van de plumula, het pluimpje, daar dit optreden van bladgroen onder afsluiting van het licht en bij gebrekkige zuurstof-verzorging hemelsbreed verschilt van dat in de gewone bladeren, die bij te geringe lichthoeveel



Een merkwaardige ramboetan vrucht.

heden (voor elke plant verschillend) geen bladgroen blijken te kunnen vormen.

Kieming van zaden binnen de vrucht is o.a. ook nog waargenomen bij meloen, maanzaad en citroen. In dit laatste geval werkt klaarblijkelijk het zure citroensap niet storend op de kieming.

J. C. v. D. M. M.

CORRESPONDENTIE.

Verzamelen van naturaliën.

Door buitenlandsche verzamelaars worden herhaaldelijk aan het Zoölogisch Museum te BUITENZORG adressen gevraagd van verzamelaars of handelaars in naturaliën in Nederlandsch-Indië.

Zij, die genegen zijn om naturaliën te ruilen of te verkoopen, worden beleefd verzocht hun adres met opgave van de diergroepen, die aangeboden kunnen worden, in te zenden aan het Zoölogisch Museum te BUITENZORG.