

DUITSE EXCURSIES

Ook dit jaar is onze sekte weer uitgenodigd om deel te nemen aan de excursies van de Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (zie boven). Voor opgave en verdere informatie kan men terecht bij Jan Cuppen.

NIEUWE LEDEN

Huibert Barendregt, Kamperfoeliezoom 12, 2353 RS Leiderdorp, tel. 071-890720.
Yde Jongema, Eykmanstraat 24, 6706 JX Wageningen, tel. 08370-22774.

VERHUISD

L. Groot, Hof van Eden 54, 5615 GP Eindhoven, tel. 040-455462.
Andre van Nieuwenhuizen, Kraneweg 8, 9718 JP Groningen, tel. 050-125523.
Menno Schilthuizen, Kamperdijklaan 4, 6866 BR Heelsum, tel. 08373-16843.

Kennisgeving van overlijden

Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat op 29 januari j.l. ons lid Chrétien (Chris) J.M. Berger op 80-jarige leeftijd in zijn woonplaats Hamont-Achel, België is overleden. De heer Berger was sinds 1933 lid van de Entomologische Vereniging en mede-oprichter van de afdeling Zuid-Nederland. Sinds 1929 verzamelde hij intensief de Nederlandse kevers; later breidde hij zijn interesse uit tot de gehele West-Palearctische fauna. Dit alles resulteerde in een van de grootste particuliere kevercollecties van ons land. Helaas stond zijn gezondheid het de laatste jaren vaak niet toe aan de activiteiten van de sekte deel te nemen.

TIEN-KEVER PROJECT II

Het eerste tien-kever project betreffende de recente verspreiding van een tiental soorten kevers werd in 1992 afgerond met een publikatie in Entomologische Berichten. We willen jullie nu oproepen tot een nieuw onderzoek naar een tiental (andere) keversoorten, waarbij niet alleen de recente waarnemingen verzameld zullen worden, maar ook het collectiemateriaal zal worden bewerkt. Op die manier kan een beeld verkregen worden van de verspreiding in het algemeen, maar ook van een eventuele voor- of achteruitgang. Bij de huidige opzet is gekozen voor de bewerking van enkele families of enkele nauwverwante soorten.

De eerste te bewerken familie is die der Pyrochroidae (Vuurkevers) met de soorten **Pyrochroa serraticornis**, **P. coccinea** en **Schizotus pectinicornis**. Deze opvallende rode kevers zijn zeer goed herkenbaar aan hun lange min of meer gekamde sprieten. De verspreidingspatronen van de soorten zijn niet bekend; waarschijnlijk is *Schizotus* beperkt tot Zuid-Limburg.

De tweede te bewerken groep is de familie Trixagidae (voorheen Throscidae) met de soorten **Trixagus (Throscus) brevicollis**, **T. dermestoides**, **T. carinifrons**, **T. elateroides** en **T. obtusus**. Mogelijk komt ook *T. duvali* in ons land voor. De familie, nauw verwant aan de kniptorren, is makkelijk te herkennen. Determinatie van de soorten is problematischer.