

Tot zover het overzicht van de invasies van vogels die de laatste jaren onze streek hebben bereikt. Ik heb geprobeerd om een zo compleet mogelijk overzicht samen te stellen. Er zullen ongetwijfeld nog meer invasies zijn geweest, die ik hier niet heb genoemd, of die simpelweg niet opgevallen zijn. Het is jammer dat er maar weinig gegevens over invasies in onze omgeving van voor 1970 bekend zijn.

Dat er voor die tijd ook grote invasies plaatsvonden in West-Europa, en ook Nederland bereikte, blijkt wel uit de wat oudere literatuur, zoals bijvoorbeeld in het boekje Vogel trek van DR. G.J. van Oordt. Hierin worden invasies besproken van het in de Aziatische steppen broedende Steppenhoen en van de Sneeuwuil. Dit zijn zo maar twee soorten die in vroeger jaren tijdens invasie-jaren in redelijke aantallen in Nederland werden waargenomen. Het is dus goed mogelijk dat beide soorten ook in Noordwijk werden waargenomen.

Van de Sneeuwuil is één waarneming bekend vanuit Noordwijk, in 1836 werd hier een exemplaar geschoten.

Het leuke van invasievogels is en blijft dat het altijd om soorten gaat die je bij ons niet of nauwelijks ziet en dat er totaal geen regelmaat in hun trekpatroon zit, dus je weet nooit wanneer ze weer zullen verschijnen.

Literatuur:

Dijk J. van en Hoek D.M. 1989. Vogels van Noordwijk en Omstreken.

Ferguson-Lees J. en Willis I. 1987. Tirions Vogelgids.

Oordt Dr. G.J. van 1943. Vogel trek.

Sovon 1987. Atlas van de Nederlandse Vogels.

Jaargang 1 t/m 14 Dutch Birding.

Diverse afleveringen van de Duinstag Katwijk.

Het archief van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk.


## Geknipt

*Kees Verweij*

Wie de kranten regelmatig volgt, kan zeker heel bijzondere dingen aan de weet komen. Ik denk, dat de meeste mensen nauwelijks op de hoogte zijn van het feit dat er verschillende soorten haaien in de Noordzee rondzwemmen.

Dit is misschien maar goed ook, want anders zouden verschillenden geen stap meer in zee durven wagen. Ze zijn er zeker niet in grote aantallen, maar blijkens bijgaande knipsels manifesteren zij zich toch op gezette tijden.

## Ongeboren doornhaai



**NOORDZEE** • Een ongeboren doornhaai op het dek van een vissersboot. Het jong werd door vissers op de Doggersbank met voedselzakje en al uit de buik gehaald van een volwassen doornhaai. Zij was verstrikt geraakt in de netten. Moeder belandde op de visafslag, het jong werd gevoerd aan de zeevogels.

De doornhaai komt vrij algemeen voor langs de Nederlandse en Belgische kust. De kleine haai heeft een grijze rug, witte buik en een stekel voor beide rugvinnen. Hij wordt maximaal een meter lang. Hij voedt zich met ongewervelde bodemdieren en kleine platvis. De haai is absoluut niet gevaarlijk voor mensen.

De doornhaai is eierlevend barend. De eieren ontwikkelen zich in de moeder tot kleine visjes. De jongen groeien door het voedselzakje leeg te eten.

FOTO • MARTIJN DE JONGE

# 'Zeldzame' blauwe haai spoorloos

LEIDEN/KATWIJK • ERNA STRAATSMA

Van de twee dode haaien die gistermorgen op het Katwijkse strand ter hoogte van de vuurtoren zijn aangespoeld, is er nog één 'spoorloos'. Het andere exemplaar, een ruim twee meter lange en dertig kilo wegende blauwe haai, is voor onderzoek overgebracht naar het Nationaal Natuurhistorisch Museum in Leiden. Volgens de politie is de 'vermist' haai, waarvan de soort niet is vastgesteld, door iemand van de Vogelwerkgroep meegenomen. Noch bij de Vogelwerkgroep in Katwijk, noch bij de Noordwijkse collega's is echter een haai binnengebracht.

De blauwe haai die zich nu Leiden bevindt, is in ieder geval een zeldzaam exemplaar. Het komt bijna nooit voor dat dergelijke dieren op de kust aanspoelen. De laatste keer dat zo iets gebeurde was in 1972, op Terschelling. De blauwe haai zwemt normaliter ten westen van Engeland en in het noordelijke deel van de Noordzee. Koos van Egmond van het Nationaal Natuurhistorisch Museum zegt dat de vis waarschijnlijk in de nacht van donderdag op vrijdag is overleden en aangespoeld. „Het is een heel vers en gaaf exemplaar. We proberen er een afgietsel van te maken voor onze tentoonstelling. Als dat goed lukt, verschilt dat bijna niet van de echte vis.”

Blaauwe haaien kunnen maximaal vier meter lang worden. Van Egmond: „Het zijn haring- en makreeleeters. Ze zijn ook bekend als menseters, maar meer in subtropische gebieden met warme wateren.” De museummedewerker zegt dat blauwe haaien in Nederland bijzonder

geliefd zijn onder sportvissers. „Die gaan vaak naar Ierland om op deze vissen te jagen.”

De blauwe haai die twintig jaar geleden op Terschelling aanspoelde, is destijds ook naar het Natuurhistorisch Museum in Leiden overgebracht. Daar is het dier geconserveerd in formaline.

ANP • Algemeen Nederlands Persbureau GPD • Gemeenschappelijke Persdienst

## Reuzenhaai voor het strand van Camperduin

ALKMAAR • ANP

Twee vogelkijkers hebben onlangs op nauwelijks honderd meter voor het strand van Camperduin een reuzenhaai waargenomen. Volgens het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (Nioz) op Texel worden reuzenhaaien slechts incidenteel in de Noordzee aangetroffen.

De haai zwom minutenlang zo dicht bij het strand dat zijn markante rug- en staartvinnen dicht bij een aantal zwemmers waren te zien, aldus amateur-ornitholoog N. van der Kamp uit Alkmaar. Niemand van hen heeft voor zover bekend de haai gezien. Van der Kamp: „En dat is misschien maar

goed ook, want er had op zo'n drukke zomerse dag gemakkelijk paniek kunnen uitbreken.”

De op ruim vier meter lengte geschatte haai kon door een deskundige aan de afgeronde vorm van zijn driehoekige rugvin als reuzenhaai worden herkend. Het zijn in alle gevallen verdwaalde exemplaren. Reuzenhaaien kunnen tot tien meter lang worden. Deze dieren leven van plankton. Ze hebben nauwelijks tanden en vallen geen mensen aan.

De wel voor de mens gevaarlijke haiesoorten als de grote witte haai komen uitsluitend voor in tropische wateren en zijn volgens het Nioz nog nooit in de Noordzee gesignaleerd.